

Εφαρμογές της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

Δέκα Στοιχειώδεις Κατασκευές:

Κ₁ : Κατασκευή ευθείας διερχόμενης από δύο σημεία.

Κ₂ : Κατασκευή κύκλου με δοθέν κέντρο και δοθείσα ακτίνα.

Κ₃ : Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου

Κ₄ : Κατασκευή ευθυγράμμου τμήματος ίσου με δοθέν και με το ένα άκρο επί δοθέντος σημείου

Κ₅ : Κατασκευή τριγώνου με δοθείσες τις τρείς πλευρές του

Κ₆ : Κατασκευή του μέσου ευθυγράμμου τμήματος

Κ₇ : Κατασκευή γωνίας ίσης με δοθείσα.

Κ₈ : Κατασκευή της διχοτόμου δοθείσης γωνίας

Κ₉ : Κατασκευή καθέτου προς δοθείσα ευθεία διερχομένης από δοθέν σημείο κείμενου εκτός της δοθείσης ευθείας.


Κ₁₀ : Κατασκευή καθέτου προς δοθείσα ευθεία διερχομένης από δοθέν σημείο κείμενου πάνω σε αυτήν.

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

1] Πρόβλημα: Να κατασκευαστεί κύκλος διερχόμενος από τρία μη συνευθειακά σημεία.

Ανάλυση του προβλήματος: Έστω τρία μη συνευθειακά σημεία τα A, B, Γ. Πρέπει




να κατασκευάσουμε ένα κύκλο που να διέρχεται από τα τρία αυτά σημεία. Ζητείται λοιπόν το κέντρο αυτού του κύκλου και η ακτίνα το. Το κέντρο ενός τέτοιου κύκλου θα πρέπει να απέχει εξίσου από τα τρία σημεία. Όμως όλα τα σημεία που ισαπέχουν από το A και το B βρίσκονται πάνω στην μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος AB. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σημεία A και Γ.

Κατασκευή: Φέρνουμε την ε μεσοκάθετο στο AB, καθώς και την ε' μεσοκάθετο στο AG. Η ε' θα τμήσει

οπωσδήποτε την ε γιατί διαφορετικά θα ήταν παράλληλη με αυτήν, και με δεδομένο ότι η ε είναι κάθετη στην AB θα πρέπει και η ε' να είναι κάθετη σ' αυτήν δηλαδή τα A, B, Γ είναι συνευθειακά! Έστω λοιπόν ότι οι ε και ε' τέμνονται στο Δ. Δηλαδή $\Delta\Delta=BD=BG$. Άρα το Δ είναι το κέντρο του ζητούμενου κύκλου και ακτίνα του η $\Delta\Delta$.

2] Πρόταση πρόβλημα: Σε δοθέν τετράγωνο να κατασκευαστεί ισόπλευρο τρίγωνο του οποίου μία κορυφή να συμπίπτει με μία κορυφή του τετραγώνου.



Ανάλυση: Υποθέτουμε ότι το ζητούμενο ισόπλευρο τρίγωνο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εκφώνηση και είναι το AEZ, εγγεγραμμένο στο δοθέν τετράγωνο το ABΓΔ.

Παρατηρούμε ότι τα τρίγωνα ABE και AΔZ είναι ίσα καθότι είναι ορθογώνια και έχουν ίσες τις υποτείνουσες, ως πλευρές ισοπλεύρου τριγώνου, και ίσες τις κάθετες πλευρές AB και AΔ, ως πλευρές του τετραγώνου.

Φέρνουμε τη διαγώνιο AG, η οποία διχοτομεί τη γωνία A του τετραγώνου. Αν λοιπόν από τις ίσες γωνίες στις οποίες μοιράζεται η A αφαιρέσσουμε αντίστοιχα τις $\Delta\Delta Z$ και EAB που είναι ίσες, τα υπόλοιπα θα είναι ίσα, δηλαδή $\angle A_1 = \angle A_2$. Αυτό σημαίνει ότι η AG διχοτομεί τη γωνία A του τριγώνου η οποία είναι 60 μοίρες. Άρα

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

$\angle A_1 = \angle A_2 = 30^\circ$. Οπότε οι πλευρές AB και AZ είναι κατασκευάσιμες σε οχέση με την AG .


Σύνθεση: Φέρουμε τη διαγώνιο AG του τετραγώνου και με κορυφή το σημείο A , και πλευρά AG , κατασκευάζουμε γωνία $A_2 = 30^\circ$, η πλευρά της οποίας τέμνει τη BG στο E . Με κέντρο το A και ακτίνα AE γράφουμε περιφέρεια η οποία τέμνει τη AG στο Z . Φέρουμε και τις EZ και AZ . Το τρίγωνο AEZ είναι το ζητούμενο.

Απόδειξη: Αφού $AE = AZ$ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου, τα τρίγωνα AEB και AZD είναι ίσα καθότι είναι ορθογώνια και έχουν ίσες τις υποτείνουσες. Άρα οι γωνίες EAB και ZAD είναι ίσες. Αν τις αφαιρέσουμε αντίστοιχα από τις GAB και GAD που είναι ίσες, τα υπόλοιπα θα είναι ίσα. Άρα $\angle A_1 = \angle A_2$ δηλαδή η ZAE είναι 60° . Οπότε και οι γωνίες της βάσης EZ είναι 60° μοίρες η κάθε μία αφού το AEZ είναι, ισοσκελές άρα είναι και ισόπλευρο.

Διερεύνηση: Αφού η κατασκευή της $A_2 (=30^\circ)$ είναι πάντα εφικτή άρα το πρόβλημα έχει πάντα λύση, η οποία είναι και μοναδική διότι η πλευρά της A_2 θα τμήσει σε ένα και μοναδικό σημείο την απέναντι στην γωνία A πλευρά του τριγώνου ABG .

Ασκήσεις για εφαρμογή:

3] Πρόταση πρόβλημα: Δίδεται μια ευθεία X, Ψ και δύο σημεία A και B στο ίδιο ημιεπίπεδο. Να βρεθεί πάνω στην $X\Psi$ ένα σημείο M τέτοιο ώστε $\gammaων(AMX) = \gammaων(BMX)$



Ανάλυση: Έστω ότι το ζητούμενο σημείο είναι το M . Φέρνουμε από το A κάθετη στην $X\Psi$ και προεκτείνουμε την BM προς το M . Οι δύο ευθείες τέμνονται σ' ένα σημείο έστω το A' .

Τα δύο τρίγωνα AGM και $GM A'$ καθότι: $\gammaων(AMX) = \gammaων(BMX) = \gammaων(GMA')$, έχουν κοινή την GM και είναι ορθογώνια. Οπότε $AG = GA'$ που σημαίνει ότι το A' είναι συμμετρικό του A . και άρα κατασκευάσιμο, άρα κατασκευάσιμη είναι και η BA' .

Σύνθεση: Κατασκευάζουμε το συμμετρικό A' του A και φέρνουμε την $A'B$ η οποία θα τμήσει την στο M . Το M είναι το ζητούμενο.


Απόδειξη: Αρκεί να δειξουμε ότι $\gammaων(AMX) = \gammaων(BMX)$. Πράγματι: Τα δύο τρίγωνα AGM και $GM A'$, είναι ίσα αφού είναι ορθογώνια, από την κατασκευή του συμμετρικού του A , έχουν μια κοινή πλευρά και $\gammaων(AMX) = \gammaων(XMA')$, αλλά και $\gammaων(GMA') = \gammaων(XMA')$, οπότε και, $\gammaων(AMX) = \gammaων(BMX) = \gammaων(GMA)$.

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

Διερεύνηση: Αφού, από τα δεδομένα, τα A και B είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο, το B και το συμμετρικό τα A σε οχέση με την $X\Psi$ θα είναι εκατέρωθεν της $X\Psi$. Έτοιμη η BA' θα έχει ένα κοινό σημείο με την $X\Psi$. Αν το A και το B βρίσκονται πάνω στην ίδια κάθετο προς τη $X\Psi$ τότε η περίπτωση είναι τετριμμένη.

4] Πρόταση πρόβλημα: Να κατασκευαστεί τετράγωνο με δεδομένο το άθροισμα της πλευράς και της διαγωνίου του.




ΑΕΖ, δηλαδή κατασκευάσιμη.

Σύνθεση: Κατασκευάζουμε ένα ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο AEZ με κάθετες πλευρές ίσες με λ . Φέρνουμε τη διχοτόμο της AEZ , η οποία τέμνει την απέναντι πλευρά στο Δ . Ορίζουμε πάνω στην AE σημείο B τέτοιο ώστε $AD=AB$ και φέρνουμε κάθετες στα B και Δ που τέμνονται στο Γ . Τα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι το ζητούμενο τετράγωνο.

Απόδειξη: Το τετράπλευρο είναι από την κατασκευή τετράγωνο. Φέρνουμε τη διαγώνιο $B\Delta$. Αρκεί τώρα να δείξουμε ότι $B\Delta+AB=\lambda$. ή ότι $B\Delta=BE$. Από την κατασκευή $AB=AD$ άρα το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισοσκελές ορθογώνιο όπως και το AEZ οπότε από την ισότητα των γωνιών των βάσεών του έχουμε ότι $B\Delta/EZ$, άρα $\phi=\rho$ αλλά και $\phi=\omega$ καθότι η $E\Delta$ είναι διχοτόμος, άρα $\omega=\rho$ δηλαδή το ΔBE είναι ισοσκελές άρα $B\Delta=BE$.

Άλλη λύση:

Ανάλυση: Έστω ότι το ζητούμενο τετράγωνο είναι το $AB\Gamma\Delta$ με $AB+B\Delta=\lambda$ δεδομένο.




Προεκτείνουμε την AB προς το B και παίρνουμε $BE=B\Delta$ οπότε $AE=\lambda$. Φέρνουμε τη ΔE . Τότε από το ισοσκελές ΔBE είναι $\rho=\omega$ αλλά και $\omega=\phi$, ως εντός εναλλάξ, άρα $\rho=\phi$, που σημαίνει ότι η ΔE είναι διχοτόμος την $B\Delta\Gamma$. Οπότε $\omega=\pi/8$, δηλαδή το τρίγωνο

$AE\Delta$ είναι κατάσκευάσιμο ως ορθογώνιο με γνωστή τη μία κάθετη πλευρά και τη προσκείμενη οξεία γωνία κλπ.

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

5] Πρόταση θεώρημα: Άν από τυχόν σημείο της βάσης ενός ισοσκελούς τριγώνου αχθούν κάθετες προς τις ίσες πλευρές του τριγώνου, τότε τα ίχνη των καθέτων, η κορυφή και το μέσον της βάσης, βρίσκονται πάνω στην ίδια περιφέρεια.



Έστω τρίγωνο ισόπλευρο το ABC και M τυχόν σημείο της βάσης του και Δ το μέσον της. Από το M φέρνουμε τις ME και MZ κάθετες στις ίσες πλευρές. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια περιφέρεια που περνά από τα E , M , Δ , Z , και Γ .


(Ανάλυση: Εέρουμε πως για να είναι τέσσερα διαφορετικά σημεία πάνω στην ίδια περιφέρεια θα πρέπει να είναι κορυφές ενός εγγράψιμου τετραπλεύρου.) Το τετράπλευρο $EM\Delta Z$ έχει δύο απέναντι γωνίες την E και τη Δ παραπληρωματικές, άρα είναι εγγράψιμο. Όμοια και το $EMZ\Gamma$. Οι κύκλοι δε που τα περιγράφουν έχουν τρία κοινά σημεία τα E , M και Γ άρα ταυτίζονται. Υπάρχει λοιπόν μια περιφέρεια που περνά τα E , M , Δ , Z , και Γ .

6] Πρόταση πρόβλημα: Άπό δοθέν σημείο A να αχθεί ευθεία τέμνονσα δοθέντα κύκλο, ώστε επί της ευθείας αυτής να ορίζεται χορδή δεδομένου μήκους.

Ανάλυση: Έστω ότι έχει αχθεί η τέμνουσα από το σημείο A , η AG η οποία τέμνει τον κύκλο με κέντρο το K αποκόπτοντας τη χορδή BG ίση με τη δοσμένη. Ενώνουμε το μέσον Δ της χορδής με το K . Τρίγωνο $AK\Delta$ που οχηματίζεται, είναι ορθογώνιο με τη AK δεδομένη και την $K\Delta$ κατασκευάσιμη αφού η BG είναι δεδομένη (ίσες χορδές απέχουν εξ' ίσου από το κέντρο του κύκλου) άρα το $AK\Delta$ είναι κατασκευάσιμο.

Σύνθεση: Με κέντρο τυχόν σημείο του δεδομένου κύκλου και ακτίνα ίση με το μήκος της δεδομένης χορδής ορίζω μια χορδή την ZH και ενώνω το μέσον της Λ με το K . Με υποτείνουσα την AK κατασκευάζω ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετη πλευρά ίση με τη $K\Lambda$, το $AK\Delta$. Το Δ θα πέσει προφανώς στο εσωτερικό του κύκλου. Προεκτείνω την AD η οποία τέμνει τον κύκλο στα B και G . Η AG είναι η ζητούμενη τέμνουσα.

Απόδειξη: Επειδή το $K\Delta$ είναι ορθογώνια εκ κατασκευής η κδ είναι κάθετη στην BG , η $K\Delta$ είναι η απόσταση του κέντρου του κύκλου από τη χορδή. Όμως $K\Delta=K\Lambda$, Άρα $BG=ZH$ αφού απέχουν το ίδιο από το κέντρο.




είναι κάθετη στην BG , η $K\Delta$ είναι η απόσταση του κέντρου του κύκλου από τη χορδή. Όμως $K\Delta=K\Lambda$, Άρα $BG=ZH$ αφού απέχουν το ίδιο από το κέντρο.

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

7] Πρόταση θεώρημα: Άδειται κύκλος Ω και μια χορδή του η AB . Από το μέσον M της του τόξου AB φέρουμε δύο τυχαίες ευθείες την MD και MG , οι οποίες τέμνουν τη χορδή AB στα σημεία Z και E αντίστοιχα. Τότε το σχηματιζόμενο τετράπλευρο $ZEGD$ είναι εγγράψιμο σε κύκλο.



(Ανάλυση: Αρκεί να αποδείξουμε ότι μια γωνία, η Γ ισούται με την απέναντι εξωτερική της την Z . Η Z όμως ως εξωτερική του τριγώνου AZM είναι $\gamma\omega\eta(Z) = \gamma\omega\eta(A) + \gamma\omega\eta(M)$.


Όμως η A βαίνει στο τόξο MB και ως εγγεγραμμένη είναι το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης, δηλαδή ίση με το μισό του τόξου MA , και το ίδιο συμβαίνει με την M και το τόξο AD .

Δηλαδή: $\gamma\omega\eta(Z) = \tau\omega\xi(MB)/2 + \tau\omega\xi(AD)/2$ αλλά $\tau\omega\xi(MB) = \tau\omega\xi(MA)$. Άρα: $\gamma\omega\eta(Z) = \tau\omega\xi(AM)/2 = \gamma\omega\eta(\Gamma)$.

Ένα σχόλιο για την ορολογία: Δοθέντος ενός τριγώνου $AB\Gamma$, χάριν συντομίας οι γωνίες του ονομάζονται \hat{A} , \hat{B} , $\hat{\Gamma}$ οι πλευρές του ονομάζονται a , b , c , το δε ύψος η διάμεσος και η διχοτόμος που περνούν από την κορυφή A , ονομάζονται αντίστοιχα μ_a , μ_b , και δ_a , ανάλογα και αυτές που διέρχονται από τις άλλες κορυφές, ενώ η περίμετρος συμβολίζεται με $2t$.

8] Πρόταση πρόβλημα: Να κατασκευασθεί τρίγωνο από τα εξής στοιχεία:


- a) β , γ , μ_a



- a) Υπόδειξη: Προεκτείνουμε τη διάμετρο μ_a κατά ίσο τμήμα το ΜΔ. Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι κατασκευάσιμο.

- b) $2\tau, A, u_a$

Υπόδειξη: Προεκτείνουμε τη βάση προς Β και Γ και παίρνουμε αντίστοιχα $BE=BA$ και $ΓZ=ΓA$. Το τρίγωνο AEZ είναι κατασκευάσιμο καθότι EZ είναι δεδομένο, το ύψος AD επίσης, και η γωνία EAZ , είναι κατασκευάσιμη αφού είναι $(\pi - A/2)$, ενώ τα σημεία B και $Γ$ προοδιορίζονται από τις μεσοκάθετες στις AE και AZ .



9] Πρόταση πρόβλημα: Να κατασκευασθεί τρίγωνο από τα εξής στοιχεία:

- a) A, u_a, μ_a
- b) A, a, μ_a
- c) A, a, u_a
- d) A, a, ρ (ρ = ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου)

10] Να αχθεί ευθεία η οποία να απέχει από δύο δοθέντα σημεία διθείσες αποστάσεις.

11] Ζίδεται ένας κύκλος και ένα σημείο εκτός αντού. Να αχθεί ευθεία που να διέρχεται από το σημείο και να είναι εφαπτόμενη στον κύκλο.

12] Ζίδεται ευθεία και σημείο εκτός αντής. Να κατασκευαστεί κύκλος με κέντρο το δοθέν σημείο εφαπτόμενος στην ευθεία.


Δέκα προβλήματα που αποδίδονται στον Απολλώνιο

- i. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχόμενη από τρία δοθέντα σημεία
(πρόκειται για την περιγεγραμμένη σε τρίγωνο περιφέρεια)
- ii. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχόμενη από δύο δοθέντα σημεία και εφαπτόμενη δοθείσης ευθείας

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου


Ε. Παπαδοπετράκης

- iii. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχόμενη διά δοθέντος σημείου και εφαπτόμενη δύο δοθέντων ευθειών



1^η Περίπτωση: Έστω οι δοθείσες ευθείες οι X και Ψ ότι τέμνονται στο B και ότι το δοθέν σημείο A δεν βρίσκεται πάνω σε καμιά από τις δοθείσες ευθείες, ούτε πάνω στην διχοτόμο της γωνίας των X και Ψ . Έστω ακόμη ότι η ζητούμενη περιφέρεια έχει κατασκευαστεί και είναι αυτή με κέντρο το K . Το K προφανώς βρίσκεται πάνω στη διχοτόμο της γωνίας $XB\Psi$, ενώ το συμμετρικό του A , το A' που είναι κατασκευάσιμο, θα βρίσκεται πάνω στην περιφέρεια. Το πρόβλημα λοιπόν ανάγεται στην κατασκευή περιφέρεια που διέρχεται από δυο δεδομένα σημεία το A και το A' και εφαπτεται δοθείσας της X (ή της Ψ).


2^η Περίπτωση: Έστω οι δοθείσες ευθείες οι X και Ψ ότι τέμνονται στο B και ότι το δοθέν σημείο A βρίσκεται πάνω σε μία από τις δοθείσες ευθείες, έστω την X . Τότε η ζητούμενη περιφέρεια που πρέπει να διέρχεται από το A θα είναι εφαπτόμενη στην X , άρα το κέντρο της θα βρίσκεται πάνω στην κάθετη της X στο σημείο A και επίσης πάνω στη διχοτόμο. Το πρόβλημα τότε έχει μία λύση.




3^η Περίπτωση: Έστω ότι οι δοθείσες ευθείες, οι X και Ψ , τέμνονται στο B και ότι το δοθέν σημείο A βρίσκεται πάνω στη διχοτόμο της γωνίας των X και Ψ . Αν φέρουμε τη διερχόμενη από το A κάθετη στη διχοτόμο $B\Phi$, τότε ο ζητούμενος κύκλος ο εγγεγραμμένος στη τρίγωνο $\Gamma\beta\delta$, ενώ μια δεύτερη λύση είναι ο παρεγγεγραμμένος στη γωνία $XB\Psi$:

Εφαρμογές της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης




4^η Περίπτωση: Αν οι χ και ψ είναι παράλληλες και το Α βρίσκεται εντός της ζώνης των παραλλήλων τότε έχουμε δύο λύσεις:



- iv. Να κατασκευαστεί περιφέρεια εφαπτομένη τριών δοθεισών ευθειών
- v. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχομένη από δύο δοθέντα σημεία και εφαπτόμενη δοθείσας περιφέρειας.
- vi. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχόμενη δια δοθέντος σημείου και εφαπτόμενη δοθείσας ευθεία και δοθείσας περιφέρειας.
- vii. Να κατασκευαστεί περιφέρεια εφαπτόμενη δοθείσας ευθείας και εφαπτόμενη δύο δοθεισών περιφερειών.
- viii. Να κατασκευαστεί περιφέρεια διερχόμενη διά δοθέντος σημείου και εφαπτόμενη δύο δοθεισών περιφερειών.
- ix. Να κατασκευαστεί περιφέρεια εφαπτόμενη δύο δοθεισών ευθειών και δοθείσας περιφέρειας.
- x. Να κατασκευαστεί περιφέρεια εφαπτόμενη τριών δοθεισών περιφερειών.

13] Πρόταση πρόβλημα: Δίδεται επίπεδο Π , ευθεία ε και τυχόν σημείο O , εκτός του Π και εκτός της ε . Να κατασκευαστεί ευθύγραμμο τμήμα AB , διερχόμενο από το O και τέτοιο ώστε το A να κείται επί της ε , το B επί του επιπέδου Π ενώ το O να είναι το μέσον του.



Ανάλυση: Έστω ότι η ευθεία ε τέμνει το επίπεδο Π στο σημείο Γ και ότι το ευθύγραμμό τμήμα AB , στο παραπάνω οχήμα είναι το ζητούμενο. Ενώνουμε το B με το Γ και πάνω στο επίπεδο που ορίζουν τα A , B και Γ , πάνω στο οποίο προφανώς βρίσκεται το O , φέρνουμε από το O παράλληλο στην $B\Gamma$. Αυτή θα τμήσει την $A\Gamma$ στο

σημείο Δ , το οποίο είναι το μέσον του $A\Gamma$. Το σημείο Δ λοιπόν είναι κατασκευάσιμο, όπως κατασκευάσιμη είναι και η ευθεία $\Gamma\zeta$ ως τομή του Π με το επίπεδο που ορίζει η δεδομένη ευθεία ε με το δεδομένο σημείο O .

Σύνθεση: Έστω $\Gamma\zeta$ η τομή του Π με το επίπεδο που ορίζει η ε με το O . Πάνω στο επίπεδο αυτό φέρνω παράλληλο από το O προς την $\Gamma\zeta$ και έστω Δ η τομή της με την ε . Με κέντρο το Δ και ακτίνα $\Delta\Gamma$ γράφω περιφέρεια πάνω στο επίπεδο που ορίζει η ε με το O . Αυτή θα τμήσει την ε στο A . Φέρνω την AO η οποία προεκτεινόμενη θα τμήσει την $\Gamma\zeta$ (ως ομοεπίπεδες) στο B . Το AB είναι το ζητούμενο.

Απόδειξη: Το Δ είναι, από την κατασκευή, το μέσον της $\Gamma\Delta$. Στο τρίγωνο $A\Gamma B$ η $A\Delta$ διέρχεται από το μέσον Δ της $A\Gamma$ και είναι παράλληλη προς την ΓB , άρα περνά από το μέσον O της AB .

Διερεύνηση: Στην περίπτωση που η ε τέμνει το επίπεδο Π , η παραπάνω λύση είναι μονοσήμαντη, αφού το Δ ορίζεται μονοσήμαντα.
Αν η ε είναι παράλληλη προς το Π το πρόβλημα δεν έχει λύση.

14] Θεώρημα των τριών Καθέτων: Εάν μια ευθεία, έστω η AB , είναι κάθετη πάνω σ' ένα επίπεδο Π και η $B\Gamma$ κάθετη πάνω σε μια ευθεία, έστω την ε , του επιπέδου Π , τότε η $A\Gamma$ είναι κάθετος στην ε .

(ΑΝΑΛΥΣΗ: Διερευνούμε τις περιπτώσεις που μια ευθεία είναι κάθετη σε μια άλλη για να δούμε ποια μπορεί εδώ να αξιοποιηθεί π.χ. ακτίνα και εφαπτόμενη,

Εφαρμογές της αναλυτικού συνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

διαδοχικές πλευρές ορθογωνίου, ύψος τριγώνου, διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου ή αρά και ύψος, κλπ. Εξετάζουμε το τελευταίο.)


Παίρνουμε δύο σημεία πάνω στην ε σκατέρωθεν του Γ και ισαπέχοντα απ' αυτό, τα Δ και Ε. Αν αποδείξουμε ότι $\overline{AD} = \overline{AE}$, έχουμε τελειώσει καθότι τότε η $A\Gamma$ θα είναι διάμεσος στο ισοσκελές τρίγωνο EAD , από την κατασκευή, ή αρά και ύψος.

Πράγματι στα τρίγωνα BGE και BGD είναι ίσα, ως ορθογώνια με ίσες μία προς μία τις κάθετες πλευρές, (η BA είναι κοινή, ενώ από την κατασκευή BG είναι μεσοκάθετος στην $E\Delta$) οπότε

για τον ίδιο λόγο είναι ίσα και τα ABE και ABD , ή αρά και $AE = AD$. Το οποίο ήταν προς απόδειξη.

15] Θεώρημα των τριών Καθέτων (αντίστροφο):

Από ένα τυχαίο σημείο το A έξω από ένα επίπεδο, το Π , φέρνουμε την AB κάθετη πάνω σε τυχαία ευθεία του επιπέδου Π , έστω την ϵ , και πάνω στο επίπεδο Π την BX κάθετη στην ϵ . Άν από το A φέρουμε μία κάθετη στην BX , τότε αυτή θα είναι κάθετη στο επίπεδο Π .



Επειδή η ϵ είναι κάθετη στην AB αλλά και στην BX , ή αρά είναι κάθετη στο επίπεδο XBA . Φέρνουμε από το Γ μία παράλληλη στην ϵ , η οποία θα είναι κάθετη και στο επίπεδο XBA , οπότε θα είναι κάθετη στην ΓA που είναι ευθεία του επιπέδου XBA . Η $A\Gamma$ λοιπόν

είναι κάθετη στην ϵ' και στην BX ή αρά είναι κάθετη στο επίπεδο Π .

16] Πρόταση πρόβλημα: Δίδεται ένα επίπεδο Π και ένα σημείο, έστω το A , εκτός αυτού. Να αχθεί κάθετος από το A στο επίπεδο Π .


Ανάλυση: Έστω ότι η AB είναι η ζητούμενη κάθετος από το A στο επίπεδο Π .

Γράφουμε μια τυχαία ευθεία, την ϵ , πάνω στο επίπεδο Π και από τον πόδα B της

Εφαρμογές της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου

Ε. Παπαδοπετράκης

καθέτου φέρουμε κάθετο στην ε , την $B\Gamma$. Φέρουμε την $A\Gamma$, η οποία σύμφωνα με το θεώρημα των τριών καθέτων, είναι κάθετη στην ε .



Σύνθεση: Θεωρούμε μια τυχούσα ευθεία του επιπέδου Π , ας είναι η ε , και από το σημείο A φέρουμε μια κάθετη στην ε , την AB . Επί του επιπέδου Π φέρουμε την BX , κάθετη στην ε . Από το σημείο τώρα A φέρουμε μια κάθετη στην BX , την $A\Gamma$. Η $A\Gamma$ είναι η ζητούμενη κάθετος από το A στο επίπεδο Π .

Απόδειξη: (Προφανής από θεώρημα 12)